

PER OGNI FASE DI MALATTIA ESISTONO DIFFERENZE DI GENERE



UOMINI E **DONNE** PRESENTANO SINTOMI DIFFERENTI DURANTE TUTTE LE FASI DELLA MALATTIA



IL MEDICO DEVE TENERE CONTO DI QUESTE DIFFERENZE PER GESTIRE AL MEGLIO I PROBLEMI DEI PAZIENTI

DIAGNOSI: DIFFERENZE NELLA FREQUENZA DI MALATTIA

LA MALATTIA DI PARKINSON E' PIU' FREQUENTE NEGLI **UOMINI** SI AMMALA

1 **DONNA**



OGNI

2 **UOMINI**



DIAGNOSI: DIFFERENZE NEI SINTOMI MOTORI ALL'ESORDIO

DONNE

- Più grandi alla diagnosi
- Hanno più frequentemente tremore come sintomo di esordio
- Sembrano avere una progressione dei sintomi più lenta in fase iniziale
- Hanno più dopamina a livello cerebrale

UOMINI

- Più giovani alla diagnosi
- Hanno più frequentemente rigidità e rallentamento motorio come sintomi di esordio

DIAGNOSI: DIFFERENZE NEI SINTOMI NON MOTORI ALL'ESORDIO

DONNE

- Nervosismo/tristezza
- Stitichezza
- Gambe senza riposo
- Dolore

UOMINI

- Riduzione dell'olfatto
- Sonno agitato
- Sonnolenza diurna
- Eccesso di saliva
- Problemi urinari e sessuali